

Informers 
les hommes

 **Protéger**
les cultures

Préserver 
l'environnement

Création Y/A/P/A/K - Crédits photos : Fredec Midi-Pyrénées, BIOBEST, CONTROCAM

Lutte contre les organismes nuisibles

marronnier



mineuse du
marronnier

organisme classé
espèce invasive



informations :
Fredec Midi-Pyrénées
05 62 19 22 30
www.fredec-mp.com

DRAF-SRPV 05 61 10 62 62
www.srpv-midi-pyrenees.com



Fédération régionale de défense
contre les organismes nuisibles



Mineuse du marronnier

organisme classé espèce invasive

Quel est cet organisme ?



Adulte

- Ce papillon de 4 mm est un ravageur du marronnier, voire de l'érable.

- Il compte entre 3 et 5 générations par an. Sa chenille mange l'intérieur des feuilles, où elle se chrysalide.



Larve

Quels sont les symptômes ?

Galeries ou mines creusées par les chenilles du papillon



- Les feuilles tombent avec deux mois d'avance, l'arbre synthétise moins de réserve pour l'hiver : les marronniers s'affaiblissent d'année en année.


Quels sont les moyens pour lutter ?

Le programme européen CONTROCAM étudie l'épidémiologie du papillon. Le papillon hiverne dans les feuilles : **ramasser les feuilles** et les composter à plus de 40 °C détruit les chrysalides.



Marronniers

Le piégeage par phéromone sexuelle peut limiter la population du papillon. En cas de forte attaque, un insecticide homologué peut compléter le ramassage des feuilles.



Pièges